

Abses Serebelum Otogenik Berulang

Written by Jacky M, Yan E, Erwi S

Friday, 22 September 2017 22:54 - Last Updated Friday, 22 September 2017 22:56

Abstrak

Pendahuluan: Abses serebelum otogenik merupakan salah satu komplikasi intrakranial dari otitis media supuratif kronik (OMSK) tipe bahaya. Hal ini merupakan kegawatdaruratan di bidang THT, yang berpotensi menjadi serius dan mengancam jiwa. Kejadian abses otak otogenik 25% dari seluruh komplikasi intrakranial dimana angka abses serebelum lebih rendah dibandingkan dengan abses serebrum. Angka kekambuhan abses otak didapatkan 5-10%.

Laporan Kasus : Dilaporkan satu kasus OMSK tipe bahaya pada seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dengan komplikasi abses serebelum berulang. Pada pasien ini sudah dilakukan drainase abses serebelum dan timpanomastoidektomi dinding runtuh. Abses di serebelum muncul lagi sehingga dilakukan drainase yang kedua untuk abses serebelum berulang. **Kesimpulan:** Abses serebelum berulang pada otitis media supuratif kronis dapat terjadi setelah operasi drainase abses serebelum dan operasi mastoidektomi. Penatalaksanaan abses serebelum adalah drainase abses dan operasi mastoidektomi yang dilanjutkan terapi antibiotik selama 3 bulan.

[artikel lengkap](#)

Kata kunci : Otitis media supuratif kronik, abses otak otogenik, timpanomastoidektomi dinding runtuh.