

## Abstrak

**Latar Belakang :** Tuberkulosis laring merupakan tuberkulosis ekstrapulmonal yang terjadi pada laring disebabkan oleh kuman Mikobakterium tuberkulosis. Prevalensi tuberkulosis yang cukup tinggi masih menjadi masalah di negara berkembang. Peranan dokter ahli THT sangat diperlukan dalam menegakkan diagnosis pasti tuberkulosis laring dan menyingkirkan diagnosis banding. Tujuan : Dapat menegakkan diagnosis dengan benar dan memberikan penatalaksanaan yang tepat untuk mengatasi infeksi dan memutus rantai penularan dari kuman Mikobakterium tuberkulosis.

Tinj  
uan pustaka :

Tuberkulosis laring merupakan suatu infeksi pada laring disebabkan oleh kuman Mikobakterium tuberkulosis. Dalam menegakkan diagnosis diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan diagnosis banding. Pemeriksaan histopatologi dengan biopsi laring masih menjadi standar baku emas dalam menegakkan diagnosis pasti. Pada penatalaksanaan tidak terdapat perbedaan antara tuberkulosis laring dan tuberkulosis paru.

### Kesimpulan :

Diagnosis tuberkulosis laring ditegakkan berdasarkan gejala klinis berupa gangguan suara seperti disfonia, gambaran tuberkel, granuloma dan ditemukan kuman penyebab pada kultur sputum. Pemeriksaan histopatologi laring masih menjadi standar baku emas dalam menegakkan diagnosis sebagai acuan penatalaksanaan selanjutnya.

[artikel lengkap](#)

**Kata kunci :** tuberkulosis paru, tuberkulosis laring, pemeriksaan histopatologi, kultur sputum